

Orchidaceae

Ophrys speculum subsp. *lusitanica*

O. Danesch & E. Danesch in Orchidee (Hamburg) 20: 21, figs. 1-3, 5-7 y 9 [fotografía (1969)]



Sinónimos

negrita = nombre aceptado rojo = homotípicos verde = heterotípicos negro = sensu

Ophrys speculum subsp. **lusitanica** O. Danesch & E. Danesch in Orchidee (Hamburg) 20: 21, figs. 1-3, 5-7 y 9 [fotografía (1969)]

Ophrys ciliata subsp. *lusitanica* (O. Danesch & E. Danesch) H. Baumann, Künkele & R. Lorenz in J. Eur. Orchid. 36: 571 (2004)

Ophrys lusitanica (O. Danesch & E. Danesch) Paulus & Gack in Israel J. Bot. 39: 77 (1990)

Ophrys vernixia subsp. *lusitanica* (O. Danesch & E. Danesch) H. Baumann & Künkele in Mitt. Arbeitskreis Heimische Orchid. Baden-Württemberg 18: 391 (1986)

Ophrys vernixia Brot., Fl. Lusit. 1: 24 (1804)

Nombres vernáculos

Abejera de espejo, abejeta, espejo de Venus, flor de abeja, flor del espejo.

Localizaciones estudiadas

España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 26, 1060 m, en pastizal de un cultivo de olivar, 30SVG 36, 880 m, en claros de bosque de *Pinus* sp. Fuensanta de Martos, 30SVG 16, 770 m, en pastizal.



A. Hábito.



B. Flor en vista frontal (izquierda). Flor en vista lateral (derecha).

Observaciones

Se diferencia de la [Ophrys speculum subsp. speculum](#) porque ésta tiene los pelos del labelo rojizos y los lóbulos laterales más cortos.

Citada por primera vez en el Suroeste de Jaén en [LARA RUIZ, J. & S. TELLO MORA \(2009\). Contribución al conocimiento de la orquidoflora del sector subbético jiennense. Micobotánica-Jaén AÑO IV N° 4 \(2009\).](#)

Descripción, distribución y otras fotografías

Flora Iberica: Tallos 15-50(65) cm, erectos, ligeramente flexuosos. Hojas basales 5,5-10(18) × 2,5-4,5 cm. Inflorescencia con (1) 5-15(18) flores. Pétalos laterales lanceolados u ovals, glabros, pardos con márgenes verdosos. Labelo 10-16(21) × 6,5-14 mm, con pilosidad densa en el margen, amarilla o de un pardo amarillento –pelos 0,4-2,4(4) mm–; lóbulos laterales 1,8-3 mm de anchura, de ovado-lanceolados a linear-lanceolados, convexos, 1,5-3,5 veces más largos que anchos; lóbulo medio 5-9 mm de anchura, obovado, convexo; seno entre los lóbulos laterales y el medio de 4,5-7 mm (profundidad mayor que la mitad que la longitud del lóbulo medio). Ginostemo 6-8(10) mm. $2n = 38$.

Pastizales y matorrales, indiferentemente al sustrato; 0-500 (1000) m. III-V. S de la Península Ibérica. Esp.: Co Ma. Port.: Ag BL E (R).



Ophrys speculum subsp. lusitanica